

《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項-“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

新型冠狀病毒及呼吸系統傳染病


- 鑑於本港確診新型冠狀病毒感染個案疫情日趨嚴重，公司對此深表關注，並已正式啟動了一系列應變措施，以加強保障員工的防疫工作。
- 所有外勤員工，如要前往以下的工地工作，應與客戶聯繫以協商押後該工作；但如不能押後，在進入這些工地前，員工需要先完成【疫病爆發期間前往存有高健康風險之工作前風險評估】、配備足夠符合要求的個人防護裝備及獲得有關管理層批准，方可前往到該工地工作。

特殊風險(Level 1)工地包括：

- 所有醫院、化驗所
- 活海鮮/家禽市場
- 監獄
- 老人院舍 及
- 衛生防護中心發出的已有確診新型冠狀病毒感染個案的大廈

高風險(Level 2)工地包括：

- 機場、渡輪及郵輪碼頭
- 鐵路車站、商場、酒店
- 賭場和會議中心/展覽館/運動場



有關詳情，請參閱附件。如有任何疑問，請向各部門經理或EHS部門查詢。

風險工地/工序與個人防疫裝備之總表

	呼吸系統	眼睛	雙手	身軀
(Level 1) 特殊風險 工地/工序	 N95	 全罩式護目鏡	防護手套	 醫用連體防護服 一般適用於：- 1)醫院病房 2)羈留病房 3)檢驗所的工作位置 4) 已有確診新型冠狀病毒感染個案的大廈進行airside工作
(Level 2) 高風險 工地/工序	 醫用外科口罩 N95 (Airside 工作)	 防護眼鏡	防護手套	NA

《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項-“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

新型冠狀病毒及呼吸系統傳染病

預防 新型冠狀病毒及呼吸系統傳染病

保持良好個人衛生

- 出入工地量體溫
- 經常保持雙手清潔，以梘液洗手，搓手最少20秒，或用含70-80%酒精搓手液潔手



打噴嚏或咳嗽時應以紙巾掩蓋口鼻



外出時應戴上外科口罩



盡量避免前往受影響地區。任何人士從內地入境，須強制接受檢疫14天。所有人一旦出現呼吸道感染病徵，請盡快求醫

保持良好的工作環境和廁所衛生


- 廁所配備梘液和抹手紙，確保沖廁系統運作正常，保持清潔乾爽
- 保持工作場所空氣流通



定期把清水注入U型隔氣口



用1比99稀釋漂白水或70%酒精進行日常清潔和消毒，常接觸面每日最少消毒兩次



嚴重污染地方以1:49稀釋漂白水消毒

《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項-“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

密閉空間

「密閉空間」指任何被圍封的地方，而基於其被圍封的性質，會產生可合理預見的指明危險，就一般而言，「密閉空間」包括井、坑槽、喉管、煙道。

一般進入密閉空間前的安全工作程序應：

1. 對照是否有新的危害未有鑑別及評估；
2. 截斷、鎖好及標示可能在密閉空間內造成危險的來源；
3. 進行空氣測試以確保在密閉空間內沒有任何有害的氣體存在及無缺氧情況出現；
4. 使密閉空間得到清洗、散熱和通風；
5. 提供密閉空間足夠可供呼吸的空氣及有效的通風系統；
6. 由合資格人士進行風險評估；
7. 提供認可的呼吸器具及個人防護設備；
8. 確保有人駐於密閉空間外與密閉空間內的工友保持聯絡，若有需要時需提供通訊設備；
9. 確保訓練及指導的工作已完成，只有受權的核准工人才可進入密閉空間內；
10. 簽發工作許可證及將危險評估報告及有關的證明書張貼於密閉空間入口的當眼處。

《有關公司對於AHU等風櫃之要求》

根據公司的規定，所有風櫃必須貼上**N.H.C.S**標貼，代表該風櫃已被定義為【非危害密閉空間】



《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項-“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》


血源性疾病

甚麼是血源性病原體？

感染性病原是微生物 - 例如在血液內帶有病毒或細菌，可導致人類染病。

血源性病原體包括但不限於

- 瘧疾
- 梅毒
- 布魯氏桿菌病
- 乙型肝炎 (HBV)
- 丙型肝炎 (HCV)
- 人類免疫缺陷病毒(HIV)



預防血源性病毒的最有效方法，就是避免直接接觸他人之血液。因此，當處理傷口前，必須首先佩戴急救藥包內的外科手術手套，防止受病毒感染。

